

GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL - APS

FICHA DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA COMPARTILHAMENTO COM O PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO

ATUALIZADO – OUTUBRO 2024

Nome:	DATA DE NASC. ____/____/____
Município:	TELEFONE: () _____
UBS de Origem:	ACS: _____

Período Gestacional			1. Características individuais, condições socioeconômicas e familiares	Escore
1º TRI	2º TRI	3º TRI		
			≤ 15 anos	3
			≥ 40 anos	2
			Não aceitação da gravidez	1
			Indícios de Violência Doméstica	2
			Situação de rua/ indígena ou quilombola	2
			Sem escolaridade	1
			Tabagista ativo	2
			Raça negra	2

Período Gestacional			2. Avaliação Nutricional (Correlacionar com gráfico da caderneta da gestante)	Escore
1º TRI	2º TRI	3º TRI		
			Baixo Peso (IMC < 18)	2
			Sobrepeso (IMC 25-29.9)	1
			Obesidade grau I e II (IMC 30-39.9)	5
			Obesidade Mórbida (IMC ≥ 40)	10

A soma dos escores dos itens 1 e 2 não configura encaminhamento direto ao alto risco (exceto a obesidade grau 3), porém merecem atenção diferenciada na APS.

Período Gestacional	3. Comorbidades prévias à gestação atual (Doenças preexistentes)	Escore
1º TRI		
	AIDS/HIV	10
	Alterações da tireoide (hipotireoidismo sem controle e hipertireoidismo)	10
	Diabetes Mellitus	10
	Endocrinopatias sem controle	10
	Cardiopatias diagnosticadas	10
	Câncer Diagnosticado	10
	Cirurgia Bariátrica há menos de 1 ano	10
	Doenças Autoimunes (colagenoses)	10
	Doenças Psiquiátricas (Encaminhar ao CAPS)	5
	Doença Renal Grave	10
	Dependência de Drogas (Encaminhar ao CAPS)	10
	Epilepsia e doenças neurológicas graves de difícil controle	10
	Hepatites (encaminhar ao infectologista)	5
	HAS crônica controlada (Sem hipotensor e exames normais)	5
	HAS crônica complicada	10
	Ginecopia (Miomatose ≥ 7cm, malformação uterina, massa anexial ≥ 8cm ou com características complexas)	5
	Pneumopatia grave de difícil controle	10
	Tuberculose em tratamento ou com diagnóstico na gestação (Encaminhar ao Pneumologista)	10
	Trombofilia ou Tromboembolia	10
	Uso de medicações com potencial efeito teratogênico	5
	Varizes acentuadas	1
	Doenças hematológicas (PTI, Anemia Falciforme, PTT, Coagulopatias, Talassemias)	10
	Transplantada em uso de imunossupressor	10

Observações: Atentar para as indicações de profilaxia de pré-eclâmpsia e protocolo de diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (GJ≥92 e/ou 1 valor de TOTG alterado);

Período Gestacional	4. Condições clínicas específicas e relacionadas às gestações prévias	Escore
1º TRI		
	2 abortamentos espontâneos consecutivos ou 3 não consecutivos (confirmados clínico/laboratorial)	5
	3 ou mais abortamentos espontâneos consecutivos	10
	Mais de um Prematuro com menos de 36 semanas	10
	Óbito Fetal sem causa determinada	10
	Pré-eclâmpsia ou Pré-eclâmpsia superposta	10
	Eclâmpsia	10
	Hipertensão Gestacional	5
	Acretismo placentário	2
	Descolamento prematuro de placenta	5
	Insuficiência Istmo Cervical	10
	Restrição de Crescimento Intrauterino	2
	História de malformação Fetal complexa	2
	Isoimunização em gestação anterior	10
	Diabetes gestacional	2
	Psicose Puerperal	5
	História de tromboembolia	10

Período Gestacional	5. Condições clínicas específicas e relacionadas à gestação atual	Escore		
1º TRI	2º TRI	3º TRI		
	Ameaça de aborto - Encaminhar URGÊNCIA			2
	Acretismo Placentário			10
	Placenta Prévia após 28 semanas			10
	Anemia não responsiva à tratamento (Hb ≤ 8) e hemopatia			10
	Citologia Cervical anormal (LIEAG) - Encaminhar para PTGI			3
	Doenças da tireoide diagnosticada na gestação			10
	Diabetes gestacional			10
	Doença Hipertensiva na Gestação (Pré-eclâmpsia, Hipertensão gestacional e Pré-eclâmpsia superposta)			10
	Alteração no doppler das Artérias uterinas (aumento da resistência) e/ou alto risco para Pré-eclâmpsia			5
	Doença Hemolítica			10
	Gemelar			10
	Isoimunização Rh			10
	Insuficiência Istmo cervical			10
	Colo curto no morfológico 2T			10
	Malformação Congênita Fetal			10
	Neoplasia ginecológica ou Câncer diagnosticado na gestação			10
	Polidrâmnio/ Oligodrâmnio			10
	Restrição de crescimento fetal Intrauterino			10
	Toxoplasmose			10
	Sífilis terciária, Alterações ultrassonográficas sugestivas de sífilis neonatal ou resistência ao tratamento com Penicilina Benzatina			10
	Infecção Urinária de repetição (pielonefrite ou ITU ≥ 3x)			10
	HIV, HTLV ou Hepatites Agudas			10
	Condiloma acuminado (no canal vaginal/colo ou lesões extensas em região genital/perianal) - Encaminhar para PTGI			5
	Feto com percentil > P90 (GIG) ou entre P3 e P10, com doppler normal (PIG)			5
	Hepatopatias (colestase ou aumento das transaminases)			10
	Hanseníase diagnosticada na gestação			10
	Tuberculose diagnosticada na gestação			10
	Dependência e/ou uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas			10

ESCORE DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Período Gestacional			Classificação de risco gestacional	Pontos	Escore total		
1º TRI	2º TRI	3º TRI			1º TRI	2º TRI	3º TRI
			Risco Habitual	ATÉ 4 PONTOS			
			Médio Risco	5 A 9 PONTOS			
			Alto Risco	10 OU + PONTOS			

DATA: ____/____/____

ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL

Risco Habitual: Deve receber atendimento de pré-natal na APS pelo Enfermeiro intercalado com médico;
Médio Risco: Deve receber atendimento de pré-natal na APS pelo médico intercalado com enfermeiro e com monitoramento pela REDE CUIDAR;
Alto Risco: Deve ser encaminhada ao PNAR, porém manter contato com plantonista da REDE CUIDAR até que primeira consulta seja realizada.