

**INFORME TÉCNICO de 20 de Julho de 2023****Dia D de Multivacinação e contra Covid-19****Dispõe sobre as orientações técnicas relativas ao dia D Estadual de Multivacinação e Covid-19**

A Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerencia Executiva de Vigilância em Saúde e Núcleo Estadual de Imunizações realizará, no dia 22 de Julho de 2023, o dia "D" de divulgação e mobilização Estadual de multivacinação, e contra a covid-19. O objetivo é ampliar a oferta da vacina, atualizar esquema vacinal de rotina e covid-19 e melhorar a cobertura das vacinais nos 223 municípios.

Ressaltamos que a multivacinação é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, mediante a avaliação do cartão ou caderneta de vacinação.

Nesta estratégia, reforça-se a necessidade de os municípios empreenderem todos os esforços para vacinar contra covid-19 os não vacinados ou com esquema incompleto e reforço, bem como a atualização do esquema de vacinação. Neste sentido, a atuação dos gestores municipais, bem como dos profissionais de saúde, é de extrema relevância na organização das ações. A comunicação social e mobilização da população são fundamentais para que se obtenha uma maior adesão a essa estratégia.

A programação de cada município é imprescindível para alcançar o elevado contingente populacional do público alvo da vacinação em curto prazo, além de evitar sobrecarga nos serviços de saúde no dia "D" de vacinação e viabilizar o aumento da capacidade logística e de pontos de atendimento. No tocante recomendamos aos municípios:

- A livre demanda no acesso a vacina, sem a necessidade de agendamento prévio para que seja executada a vacinação;
- Articulação com as sociedades científicas, entidades de classe e outros órgãos e instituições para fortalecer o envolvimento dos profissionais de saúde, da comunidade científica, da sociedade civil e dos educadores, assim como influenciar na captação da população alvo da ação;
- Divulgar nas redes sociais do município, rádios comunitárias e carros de som o Dia "D", levando também as informações dos locais de vacinação e demais ações;
- Ampliar no dia os pontos estratégicos de vacinação para ações extramuro em praças, parques, rodoviárias, igrejas, escolas, feiras livres, dentre outros;
- Promover o acesso e disponibilização da vacina à população rural e demais comunidades de difícil acesso de modo a ampliar essa oferta da vacina;
- Alimentar o sistema de informação com as doses aplicadas a cada aplicação de imunobiológico a fim de garantir o registro correto;





- Monitoramento das doses aplicadas, possibilitando a organização do processo de trabalho e contribuindo para a vigilância das coberturas vacinais e, dessa forma, para o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis.

As vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação na faixa etária de 6 meses de idade ou mais;

Em relação aos Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) graves, raros e/ou inusitados e erros de imunização (programáticos), deverão ser notificados, seguindo o fluxo estabelecido pela SES. Os ESAVI relacionados com as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações devem ser notificados no e-SUS Notifica – Módulo EAPV (<https://notifica.saude.gov.br/>).

Ressaltamos que os registros das doses da vacina covid-19 estão contidos na NOTA INFORMATIVA Nº 11 - 27 de fevereiro de 2023.

Para mais detalhes dos esquemas de vacinação contra covid-19 deve ser consultado o Informe Técnico Operacional de vacinação contra covid-19 e esquema de vacinação em anexo.

A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br

Atenciosamente,


Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6

Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat: 173.656-6



Márcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
**Coordenadora do Núcleo Estadual de
Imunizações – SES/PB**
Mat:191.382.-4




Covid-19: Esquema vacinal de doses - por grupo etário

(Novas nomenclaturas de tipos de dose covid-19 monovalente - 2023)




Para Pfizer Baby 6 meses a 4 anos



Transição de faixa etária

Crianças que iniciaram o esquema com a Pfizer Baby e completaram 5 anos de idade deverão utilizar a vacina Pfizer Pediátrica para completar o esquema (D2 e/ou R1).

Para CoronaVac 3 a 4 anos



ATENÇÃO!

Reforço preferencialmente com Pfizer Baby, na indisponibilidade administrar CoronaVac

Registro no sistema:
1º Reforço (R1), se a vacina administrada for CoronaVac;
3ª dose (D3), se a vacina administrada for Pfizer Baby.





Covid-19: Esquema vacinal de doses - por grupo etário

5 a 11 anos

Pfizer pediátrica e Coronavac



* intervalo 4 semanas para Coronavac

5 a 11 anos (imunocomprometidos)

Pfizer pediátrica e Coronavac



* intervalo 4 semanas para Coronavac

ATENÇÃO!


Reforço preferencialmente com Pfizer Pediátrica, na indisponibilidade, utilizar CoronaVac.

Se a criança ou adolescente mudarem de idade durante a série primária, elas deverão receber a dose apropriada para idade atual e seguir o intervalo recomendado para a faixa etária correspondente, até completarem o esquema.

O esquema primário deve ser completado utilizando o mesmo imunizante e, excepcionalmente, em casos em que não é possível completar o esquema com o imunizante utilizado na primeira dose, a intercambialidade de vacinas aprovadas para a faixa etária pode ser realizada.



Covid-19: Esquema vacinal de doses - por grupo etário



* intervalo 4 semanas para Coronavac

ATENÇÃO!

Pessoas a partir de 18 anos que completaram o esquema primário ou que já receberam uma ou duas doses de reforço com monovalente, estão aptas a receber a dose de reforço bivalente Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.

Vacinas recomendadas para esquema PRIMÁRIO:

12 a 17 anos: Pfizer ou CoronaVac

18 a 39 anos: Pfizer ou CoronaVac

40 Anos e mais: Pfizer ou AstraZeneca, Janssen ou Coronavac

Gestantes: deverão ser vacinadas com as plataformas Pfizer ou CoronaVac

RECOMENDAÇÃO PARA DOSES DE REFORÇO BIVALENTE

Pessoas **NÃO** vacinadas ou que receberam **APENAS UMA** dose da vacina, devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses de vacina monovalente.






Covid-19: Esquema vacinal de doses - por grupo etário

COVID - 19 | ESQUEMA VACINAL DE DOSES - PARA IMUNOCOMPROMETIDOS

IMUNOCOMPROMETIDOS (12 ANOS MAIS)



* Intervalo 4 semanas para Coronavac

Vacinas recomendadas para esquema PRIMÁRIO monovalente:

12 a 17 anos: Pfizer ou CoronaVac
18 a 39 anos: Pfizer ou CoronaVac
40 Anos e mais: Pfizer ou AstraZeneca, Janssen ou Coronavac
Gestantes: deverão ser vacinadas com as plataformas Pfizer ou CoronaVac

ATENÇÃO!

RECOMENDAÇÃO PARA DOSES DE REFORÇO BIVALENTE

Pessoas **NÃO** vacinadas ou que receberam **APENAS UMA** dose da vacina, devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses de vacina monovalente.

Pessoas que completaram o esquema primário ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, estão aptas a receber a dose de reforço bivalente Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.

SE O USUÁRIO IMUNOCOMPROMETIDO TIVER TOMADO APENAS D1 E D2 DA VACINA MONOVALENTE, A DOSE D3 (8 SEMANAS APÓS D2) E R1 PODEM SER FEITAS COM A PFIZER BIVALENTE, SENDO QUE O REGISTRO DAS DOSES SERÁ REF + REF E ENCERRA O ESQUEMA



Covid-19: Esquema vacinal de doses - por grupo etário

Pfizer bivalente



Recomendação de vacinação com a vacina COVID-19 bivalente conforme a situação vacinal prévia para toda a população a partir de 18 anos e a partir de 12 anos para grupos prioritários.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PRÉVIO MONOVALENTE

RECOMENDAÇÃO PARA DOSES DE REFORÇO BIVALENTE

Se 0 ou 1 dose



Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses da vacina monovalente. Após completar o esquema primário, a dose de reforço bivalente Pfizer poderá ser administrada com intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário.

Se 2 doses
Se 3 doses
Se 4 doses



Pessoas que completaram o esquema primário ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, estão aptas a receber a dose de reforço bivalente Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.

