

RELAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS



Rua Alberto de Brito, s/nº.
Jaguaribe, João Pessoa/PB.

CEP: 58015-320

(83) 36125030

crie.pb@gmail.com

1. Vacina adsorvida difteria e tétano infantil (dupla infantil - DT)

Encefalopatia nos sete dias subsequentes à administração de dose anterior das vacinas Penta de células inteiras (DTP+Hib+HB), Penta acelular (DTPa_Hib+VIP) e Hexa acelular (DTPa+Hib+HB+VIP).

2. Vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis acelular infantil (DTPa), Penta acelular (DTPa/Hib/VIP) e Hexa acelular (DTPa/HIB/hb/VIP)

1. Após os seguintes eventos adversos graves ocorridos com a aplicação da vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (DTP) ou com a vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Penta de células inteiras):

- a. Convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após a vacinação.
- b. Episódio hipotônico-hiporresponsiva (EHH)

nas primeiras 48 horas após a vacinação.

2. Para crianças que apresentem risco aumentado de desenvolvimento de eventos graves à vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (DTP) ou à vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (DTP) ou à vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B e *Haemophilus influenzae* tipo b (Penta de células inteiras):

- a. Doença convulsiva crônica.**
- b. Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação em vigência de febre.**
- c. Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.**
- d. Bebês que ainda permaneçam internados na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação.**
- e. Bebês prematuros nascidos com menos de 33 semanas (até 32 semanas e 6 dias) ou com menos de 1.500 gramas de peso ao nascimento**

3. Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:

- a. Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica.**

- b. Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de imunodepressão terapêutica.
- c. Transplantados de órgãos sólidos (TOS).
- d. Transplantados de células-tronco hematopoéticas (TCTH) .

3. Vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis acelular adulto (dTpa)

- 1. Gestantes a partir de 20 semanas de gestação e puérperas até 45 dias.
- 2. Todos os profissionais de saúde, principalmente os que atuam em maternidades em unidades de internação (UTI/UCI convencional e UCI Canguru) e aqueles com maior contato com recém-nascidos (RNs), tais como fisioterapeutas, estagiários da área da saúde.
- 3. Transplantados de células tronco-hematopoiéticas (TCTH).

Para gestantes, puérperas trabalhadores de saúde, essa vacina (dTpa) estará disponível na rede de saúde. Nos CRIE, poderá ser aplicada, nas indicações preconizadas, quando o

o paciente receber outras vacinas especiais.

4. Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)

1. Indivíduos que apresentaram algum tipo de hipersensibilidade quando da utilização de qualquer soro heterólogo (antitetânico, antirrábico, antidiftérico, antiofídico etc.).
2. Indivíduos imunodeprimidos, nas indicações de imunoprofilaxia contra o tétano, mesmo que vacinados. Os imunodeprimidos deverão receber sempre a IGHAT no lugar do soro antitetânico (SAT), em razão da meia-vida maior dos anticorpos
3. RN em situações de risco para tétano cujas mães sejam desconhecidas ou não tenham sido adequadamente vacinadas.
4. RN prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, independentemente da história vacinal da mãe.

5. Vacina Haemophilus influenza e tipo b (conjugada) – Hib

1. Nas indicações de substituição de Penta de células inteiras por DTP acelular + Hib + HB, quando necessário.
2. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).
3. Transplantados de órgãos sólidos (TOS).
4. Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA).
5. Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica.
6. Imunodepressão terapêutica.
7. Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade.
8. Fístula liquórica e derivação ventrículo-peritoneal (DVP).
9. Implante coclear.
10. Hemoglobinopatias.
11. Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.

Observação: Em crianças menores de 7 anos, nas indicações de substituição da vacina Penta de células inteiras, caso não estejam disponíveis vacinas combinadas acelulares contendo Hib.

6. Vacina hepatite A (HA)

Nas seguintes condições, se suscetíveis:

1. Hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C (VHC).
2. Portadores crônicos do VHB.
3. Coagulopatias.
4. Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA)
5. Imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora.
6. Doenças de depósito.
7. Fibrose cística (mucoviscidose).
8. Trissomias.
9. Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes.
10. Transplantados de órgão sólido (TOS).

11. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).
12. Doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), cadastrados em programas de transplantes.
13. Hemoglobinopatias.
14. Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.

7. Vacina contra hepatite B (HB) e imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB)

• VACINA HB PARA INDIVÍDUOS SUSCETÍVEIS

Os pacientes suscetíveis ao VHB pertencentes a grupos especiais devem ser vacinados contra hepatite b nos Crie, caso já não o tenham sido em outros serviços, em virtude da vacinação uiversal adotado pelo País. O manual do CRIE apresenta as doses e esquemas para os pacientes renais crônicos e hemodialisados e para as demais condições. Como também os esquemas e doses PVHA em menores de 19 anos e para maiores de 19 anos.

- **IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B PARA INDIVÍDUOS SUSCETÍVEIS:**
 1. Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B.
 2. Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB.
 3. Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B.
 4. Vítimas de violência sexual.
 5. Imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados.
- **IMUNOPROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO APLICAR VACINA E IMUNOGLOBULINA, DENTRO DAS INDICAÇÕES DO MANUAL.**
 1. Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B.
 2. Vítimas de acidentes com material bilógico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB.
 3. Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B.
 4. Vítimas de violência sexual.
 5. Imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados.

8. Vacina HPV quadrivalente (6, 11, 16 e 18)

1. Na rotina para meninos e meninas de 9 a 14 anos que tenham indicação de vacinação nos CRIE e que não sejam imunocomprometidos: usar duas doses conforme rotina do PNI/MS.
Exemplo: cardiopatas, pneumopatas, portadores de fístula liquórica, entre outros.
2. Pessoas com imunodeficiência primária ou erro inato da imunidade, de 9 a 45 anos, não vacinadas ou que receberam esquema incompleto de vacinação.
3. Pessoas em uso de drogas imunossupressoras de 9 a 45 anos.
4. Pessoas vivendo com HIV/aids de 9 a 45 anos de idade.
5. Transplantados de órgãos sólidos de 9 a 45 anos de idade.
6. Transplantados de células tronco-hematopoiéticas (tcth): de 9 a 45 anos.
7. Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica: de 9 a 45 anos.
8. Vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos.
9. Portadores de papilomatose recorrente (PPR).

Observação: a vacina HPV4 não está contemplada nas condições do CRIE para pacientes com NIC 1, 2 ou 3.

9. Imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR)

- 1. Pessoas que tem contato frequente com equídeaos ou que tenham feito uso prévio de soro heterólogo, preferencialmente utilizar imunoglobulina humana.**
- 2. Indivíduoas que apresentaram algum tipo de hipersensibilidade a qualquer soro heterólogo.**
- 3. Indivíduoas imunocomprometidos, nas indicações de imunoprofilaxia contra raiva, mesmo que vacinados, nas situações de pós-exposição da risco, conforme descrito no Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.**

10. Vacina influenza inativada (INF) – “Vacina contra gripe”

- 1. Pessoas vivendo com HIV/aids.**
- 2. Transplantados de órgãos sólidos (TOS)**
- 3. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).**
- 4. Doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) devidamente cadastrados nos programas de doação.**
- 5. Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade.**
- 6. Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica**
- 7. Pessoas em uso de drogas imunossupressoras.**
- 8. Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos.**
- 9. Trabalhadores de saúde.**
- 10. Cardiopatias crônicas.**
- 11. Pneumopatias crônicas.**
- 12. Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.**
- 13. Diabetes.**
- 14. Fibrose cística.**
- 15. Trissomias.**

- 16. Implante de coclear.**
- 17. Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.**
- 18. Usuários crônicos de ácido acetilsalicílico.**
- 19. Nefropatia crônica/síndrome nefrótica.**
- 20. Asma.**
- 21. Hepatopatias crônicas.**
- 22. Obesidade grau III.**
- 23. Fístula liquórica e derivação ventrículo-peritoneal (DVP).**

11. Vacina meningocócica C conjugada (Meningo C) e vacina meningocócica ACWY conjugada (MenACWY)

Vacina MenC

- 1. Pessoas em uso de drogas imunossupressoras.**
- 2. Paciente oncológico com doença em atividade ou até alta médica.**
- 3. Fístula liquórica e derivação ventrículo-peritoneal (DVP)**
- 4. Implante coclear.**
- 5. Triossomias.**
- 6. Doenças de depósito.**
- 7. Hepatopatia crônica.**
- 8. Doença neurológica incapacitante.**

Vacina MenACWY

- 1. Asplenia anatômica e funcional, doença falciforme e talassemias.**
- 2. Deficiência de complemento e frações.**
- 3. Terapia com inibidor de complemento.**
- 4. Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA)**
- 5. Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade.**
- 6. Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).**
- 7. Transplante de órgãos sólidos (TOS).**
- 8. Microbiologista rotineiramente exposto a isolamento de *Neisseria meningitidis*.**

12. Vacina pneumocócica polissacarídica (VPP23) e conjugada (VPC10 E VPC13)

A vacina VPC13 seguida da vacina VPP 23 está indicada nas seguintes condições:

- 1. Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA).**
- 2. Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica.**
- 3. Transplantados de órgãos sólidos (TOS).**
- 4. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).**

- 5. Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.**
- 6. Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade.**
- 7. Fibrose cística (mucoviscidose).**
- 8. Fístula liquórica e derivação ventrículo peritoneal (DVP).**

A vacina VPC10 seguida da vacina VPP 23 está indicada para crianças até 59 meses de idade nas condições enumeradas a seguir. A vacina VPP 23 está indicada para crianças a partir de 2 anos de idade, adolescentes e adultos, segundo as situações de risco enumeradas abaixo:

- 9. Imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica.**
- 10. Implante coclear.**
- 11. Nefropatias crônicas/hemodiálise/síndrome nefrótica.**
- 12. Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve.**
- 13. Asma persistente moderada ou grave.**
- 14. Cardiopatias crônicas.**
- 15. Hepatopatias crônicas.**
- 16. Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.**
- 17. Trissomias.**
- 18. Diabetes.**
- 19. Doenças de depósito.**

Observação: nos casos de esplenectomia eletiva, a vacina deve ser aplicada pelo menos duas semanas antes da cirurgia. Em casos de quimioterapia (QT), a vacina deve ser aplicada preferencialmente 15 dias antes do início da QT.

Atenção: a VPP23 não está disponível nos Crie para investigação diagnóstica de imunodeficiências.

13. Vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP)

1. Crianças imunodeprimidas com deficiência imunológica congênita ou adquirida não vacinadas ou que receberam esquema incompleto de vacinação contra poliomielite.
2. Crianças que estejam em contato domiciliar ou hospitalar com pessoa imunodeprimida.
3. Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).

4. Crianças com história de paralisia flácida associada à vacina, após dose anterior de vacina oral poliomielite (VOP).

Observação: adultos imunodeprimidos, se houver indicação da vacinação contra a poliomielite, de acordo com normal do DPNI.

14. Vacina contra varicela (VZ) e imunoglobulina humana antivaricela-zoster (IGHAVZ)

Vacinação pré-exposição em suscetíveis:

1. Pessoas imunocompetentes de grupos especiais de risco (profissionais de saúde, cuidadores e familiares), suscetíveis à doença, que estejam em convívio domiciliar ou hospitalar com pacientes imunodeprimidos.
2. Crianças a partir de 9 meses de idade imunocompetentes e suscetíveis à doença, no momento da internação, em que haja caso de varicela.
3. Candidatos a transplante de órgãos sólidos, suscetíveis à doença, até pelo menos quatro semanas antes do procedimento, desde que não estejam imunodeprimidos.
4. Pacientes com nefropatias crônicas.
5. Pacientes com síndrome nefrótica.

- 6. Doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).**
- 7. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH): para pacientes transplantados há 24 meses ou mais, sendo contraindicadas quando houver doença enxerto versus hospedeiro.**
- 8. PVHA suscetíveis à varicela, a depender da condição imunológica (LT CD4+)**
- 9. Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral (com imunidade celular preservada).**
- 10. Pacientes com doenças dermatológicas graves, tais como: ictiose, epidermólise bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave e outras assemelhadas.**
- 11. Indivíduos em uso crônico de ácido acetilsalicílico (suspenso uso por seis semanas após a vacinação).**
- 12. Indivíduos com asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.**
- 13. Pacientes com trissomias.**

Vacina pós-exposição

A vacina é indicada para controle de surto em ambiente hospitalar, creches e escolas que atendam crianças menores de 7 anos, para os comunicantes suscetíveis imunocompetentes, a partir de 9 meses de idade, até 120 horas (5 dias) após o contato.

Imunoglobulina pós-exposição

Deve ser utilizada até 96 horas após o contato, desde que atendidas as três condições seguintes: suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco, conforme definidas abaixo:

2. Deve ter havido contato significativo com o vírus varicela-zóster (VVZ):

- a. **Contato domiciliar contínuo:** permanência junto com o doente durante pelo menos uma hora em ambiente fechado.
- b. **Contato hospitalar:** pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou que tenham mantido com ele contato direto prolongado, de pelo menos uma hora.

3. O suscetível deve ser pessoa com risco especial de desenvolver varicela grave:

- a. Crianças ou adultos imunodeprimidos.
- b. Menores de 9 meses em contato hospitalar com VVZ.
- c. Gestantes.
- d. RN de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos cinco últimos dias de gestação ou até 48 horas depois do parto.
- e. RN prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela.
- f. RN prematuros, com menos de 28 semanas de gestação (ou com menos de 1.000 g ao nascimento), independentemente de história materna de varicela.