

CORONAVÍRUS (COVID-19)

1. Informações Gerais

No período de 25 de fevereiro a 15 de março de 2020, foram notificados à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba 39 casos suspeitos de COVID-19 (Tabela 1).

Tabela 1. Situação epidemiológica dos casos notificados para COVID-19. Paraíba, 2020.

Notificados	Confirmados	Descartados ¹	Em investigação
39	0	11	28

¹ Nota: Caso descartado é aquele que apresenta confirmação laboratorial para outro agente etiológico ou resultado negativo para COVID-19.

Fonte: RedCap COVID-19

Dos casos descartados, 3 (27,2%) foram negativos para influenza e outros vírus respiratórios, 4 (36,4%) positivos para Influenza A H1N1, e 4 (36,4%), para Rinovírus.

Tabela 2. Distribuição dos casos notificados para COVID-19, segundo sexo. Paraíba, 2020.

Sexo	N	%
Feminino	23	59
Masculino	16	41
Total	39	100


Fonte: RedCap COVID-19

Tabela 3. Distribuição dos casos notificados para COVID-19, segundo faixa etária. Paraíba, 2020.

Idade (anos)	N	%
< 1	0	-
1 – 4	0	-
5 - 9	1	2,6
10 – 19	1	2,6
20 – 29	11	28,2
30 – 39	11	28,2
40 – 49	2	5,1
50 - 59	7	17,9
Acima de 60	6	15,4
Total	39	100,0

Fonte: RedCap COVID-19

Gráfico1. Distribuição dos casos notificados para COVID-19, segundo sinais e sintomas². Paraíba, 2020.



Fonte: RedCap COVID-19

Tabela 4. Distribuição dos casos notificados para COVID-19, segundo município de residência e classificação final. Paraíba, 2020

Município de Residência	Em investigação	Confirmados	Descartados	Total
Bananeiras	1	0	0	1
Cabedelo	1	0	0	1
Campina Grande	9	0	1	10
Cuité	1	0	0	1
João Pessoa	16	0	10	26
Total	28	0	11	39

Fonte: RedCap COVID-19

2. Definições Operacionais

CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

• Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de qualquer país **E** presente: febre³ **E** pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia); **OU**

• Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO⁴: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 **E** presente: febre **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia).

CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

• Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente: Febre **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) **OU** outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.

Definições operacionais:

³Febre: Considera-se febre temperatura acima de 37,8° a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.

⁴Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:

- Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
- Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções);
- Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros; ○ Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
- Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;
- Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado.

CONTATOS

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS/PB, Telefone: (83) 98828-2522 e E-mail: cievs.pb@gmail.com

ELABORAÇÃO: Centro de Operacional de Emergências em Saúde Pública | COE-COVID-19